



Detail produktu

Brodisan Blue PE granule k hubení hlodavců sáček, 150 g

Rodenticidní přípravek ve formě modře zbarvených granulí pro použití širokou veřejností a profesionálními uživateli k regulaci výskytu škodlivých hlodavců v budovách a jejich blízkém okolí.

Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty.

Dávkování Brodisan Blue PE:

Potkani: 100-200 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Pokud je potřebné mít více deratizačních staniček, měly by být od sebe vzdáleny minimálně 5m. Nástraha by neměla být používána jako trvalá za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců.

Použití Brodisan Blue PE:

Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by nebylo pro dosažení požadovaného účinku dostatečně použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by měl přípravek být aplikován v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, které jsou umístěny mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v blízkosti míst očekávaného výskytu hlodavců. Pokud je to možné, měly by být staničky zajištěny připevněním k zemi nebo pevných bodům proti odtahování. Před aplikací přípravku by měly být z ošetřených prostor odstraněny všechny potraviny a krmiva. Staničky by měly být označeny výstražnými informacemi Nepřemísťujte a neotvírejte. Obsahuje přípravek na hubení hlodavců Brodisan Blue MM s úč. látkou brodifakum. V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Po ukončení činnosti si umyjte ruce a případně znečištěnou kůži mýdlem a vodou. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů od zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky jsou neporušené a za účelem sběru uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplnit. Znečištěnou nebo znehodnocenou návnadu odstranit. Pokud během 35 dnů od zahájení deratizace nedojde k potlačení výskytu hlodavců, vyžádejte si radu od dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. Přípravek a hlodavci intoxikovaní přípravkem mohou být nebezpeční pro děti, necílová zvířata a ptáky.

Upozornění:

Pokyny pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu: na konci deratizace odstraňte nespotřebovanou a dále nepoužitelnou nástrahu a znečištěný obal jako nebezpečnou látku. Nejvhodnější metodou je jejich spálení ve spalovně nebezpečného odpadu. Uhynulé hlodavce je možné odstranit spálením nebo zahrabáním na místě, kde nedojde k znečištění podzemní vody. Jednotlivá zvířata uhynulá při neprofesionálním zásahu je možné uložit do systému sběru komunálního odpadu.

EAN:	8594015800165
Obj. číslo:	678163
Výrobce:	Tekro
Značka:	Brodisan
Hmotnost	0,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/brodisan-blue-pe-granule-k-hubeni-hlodavcu-sacek-150-g